

Inför donationsoperation

Utredning av patientens medicinska lämplighet som organdonator, utredning av inställning till donation och bedömning att patienten förmodas avlida inom tidsramen för DCD är utförd på IVA.

Det är viktigt att operationspersonalen får information tidigt om att en DCD-process är påbörjad och att den personal (DCD-teamet) som ska delta i processen involveras. Planering av tidpunkt för avbrytande av livsuppehållande behandling görs i samråd mellan IVA, operation och transplantationsenheten.

Använd gärna Flödesschema för operation som stöd under processen, se kap. 20.

Operationsanmälan sker enligt sjukhusets lokala rutin.

Vanligast är att man redan tidigare bestämt vilken operationssal som lämpar sig bäst för en DCD-process. Hur lång tid operationssalen kan komma att nyttjas varierar beroende på tid från avbrytande av livsuppehållande behandling till start av operationen samt vilka organ som ska tillvaratas.

- Preoperativ tvätt/descutantvätt och eventuell hårvorkning enligt lokala rutiner som inför en "vanlig" operation
- Vid planerad Normoterm Regional Perfusion, NRP, beställs blod av IVA i samråd med transplantationskoordinator. För beskrivning av NRP, se kap. 16

Förmöte

Detta är ett gemensamt möte för personal från IVA, operation och transplantationsteam som hålls 1–2 timmar innan planerat avslut av livsuppehållande behandling, på överenskommen plats. Se till att operationssalen, i den mån det går, är iordningställd innan förmötet*, se lokal checklista.

Intensivvårdsläkaren informerar transplantations- och operationsteamet om den potentiella donatorn. **Vid eventuell lungdonation** sker planering och förberedelse inför reintubering på operationssalen, inklusive planering för eventuell svår luftväg.

Transplantationskirurg/er informerar om vilka organ som planeras att omhändertas, tidsramarna för de olika organen och förfarande vid eventuell NRP, Normoterm Regional Perfusion.

Följande dokument ska kontrolleras av ansvarig transplantationskirurg enligt SOSFS 2012:14

- Journalhandling för donationsingrepp på avliden donator – DBD/DCD
- Donatorkarakterisering
- Blodgruppering

Transplantationskoordinator synkroniserar tid och telefonnummer med **samordnande sjuksköterska på IVA**.

Förberedelser på operation

Frys 10 liter NaCl 9 mg/ml till ice-slush, gärna 500ml påsar som är lättare att hålla sterila.

Tips!

- För bästa ice-slush låt påsarna ligga plant på hyllorna i frysen, inte packade på varandra.
- Efter ca 1–2 timmar vänd och känn på påsarna under infrysning så det inte blir hårdfrusna klumpar.
- Det kan ta olika lång tid beroende på frys, oftast 6–8 timmar.
- När det har blivit bra konsistens på slushen kan man flytta påsarna till kylan, där den håller sig bra.
- Blir den för tinad, flytta tillbaka till frysen.