



Caine Mix II

Patientinformation

Testningen som Du varit med om visar att Du är kontaktallergisk för ovanstående testberedning.

Om du enbart reagerat med en svag reaktion för caine mixen har du vanligen inga besvär av din kontaktallergi. Skulle du ändå vid något tillfälle få utslag i samband med att du får lokalbedövning eller reagerar på en smärtstillande gel/plåster bör du göra om testningen med varje lokalbedövningsmedel enligt nedan för att veta vad du är allergisk emot.

Caine mix II innehåller 3 ämnen: **dibukain**, **lidokain** och **tetrakain**. Om Du även har blivit testad med enskilda har doktorn markerat vilket eller vilka Du reagerat mot nedan detta nedan. Om Du dessutom blivit testad med ytterligare bedövningsmedel framgår det av separat information.

Det är viktigt att komma ihåg att kontaktallergi i sig inte är någon sjukdom. Vid tillräckligt stor hudkontakt med det allergiframkallande ämnet kan dock allergiskt eksem uppkomma. Vid stark allergi kan en mycket liten mängd av ämnet utlösa en eksemreaktion. Vid svag allergi krävs större mängd. Vid hudkontakt uppträder eksemet normalt efter ca 1 dygn och kan kvarstå någon vecka efter att kontakten med ämnet upphört. Det effektivaste sättet att förhindra att allergiskt kontakteksem utvecklas är att undvika kontakt med ämnet eller produkter där ämnet ingår.

Dibukain är ett lokalbedövande ämne som ingår under namnet **cinkokain** i följande läkemedel i Sverige (FASS 2022):

Scheriproct N rektalsalva, suppositorier
Silverklorid APL, spolvätska

Lidokain kan ingå som lokalbedövande medel i salvor och preparat för injektion samt i ögondroppar och hjärtmedicin. Lidokain ingår i följande läkemedel i Sverige (FASS 2022):

Xyloproct rektalsalva, suppositorier
Doloproct, rektalkräm och suppositorier
Lidocain/Prilokain kräm
Emla salva och plåster
Maxilene kräm
Oraqix periodontalgel (lidokain + prilokain)
Rapydan plåster (lidokain + tetrakain)
Tapin kräm (lidokain + prilokain)
Tapin medicinskt plåster
Versatis plåster
Denela kräm
Fortacin kutan spray
Xylocain kutan spray
Xylocain salva



Skånes universitetssjukhus

Hudkliniken

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Malmö

Senast uppdaterad 2023

Lidokain-Fluorescein Bausch and Lomb, ögondroppar
Triolif apelsin/ trilofin honung citron/mint; sugtablett
Instillagel, lokalbedövning tex vid katetersättning
Xylocain gel, salva, kräm

Injektion: Depo_medrol cum lidocain
Lidocain Aguettant
Lidokain injektionsvätska
Mydrane, injektionsvätska
Xylocain, injektionsvätska
Xylocard, injektionsvätska
Rocephalin med lidokain

Det finns även parallellimporterade läkemedel samt apotekstillverkade vilket gör att det är bra att ha med informationen om din allergi så du kan fråga på apotek och hos doktor.

Tetrakain kan ingå som lokalbedövande medel i (FASS 2022)

Tetrakain Bausch and Lomb, ögondroppar

Rapydan, medicinskt plåster

Vid kontakt med sjukvårdspersonal och tandläkare bör Du alltid informera om att Du har kontaktallergi mot något/några lokalbedövningsmedel och vilka. Tag gärna med denna information vid sådana besök.